

MATHEMATIQUES

Révisions



Matière

Algèbre

Polynômes

Factorisation

Fractions algébriques

Fonctions

Equations, systèmes
d'équations et inéquations

Géométrie

Triangles isométriques

Thalès et triangles
semblables

Trigonométrie

Pythagore

Angles isométriques

Quelques pistes



- ♥ Faire une synthèse par chapitre
- ♥ Etudier la théorie (Tu dois étudier chez toi)
- ♥ Refaire les exercices faits en classe
- ♥ (par écrit et pas seulement les lire !)
- ♥ Vérifier sa compréhension en faisant les exercices de révision

Attention, les exercices ci-dessous ne sont pas exclusifs, autrement dit tu ne dois pas te contenter de ceux-là uniquement.

I. Polynômes

A. Polynômes et manipulation basique.



1) Cite toutes les « caractéristiques » du polynôme donné (il y en a 5) : $P(t) = -9,5t^3 + 4t^5 + 7$

2) Complète le tableau suivant :

Polynôme	Terme indépendant	Degré ?	Réduit ?	Ordonné ?	Complet ?
$3x^5 - 7x^3 + 4x - 3$					
$-9,5t^3 + 4t^5 + 7 - 3t - 2t^2$					

3) Réduis et ordonne les polynômes suivants

Polynôme	Polynôme réduit et ordonné
$B(x) = 2x + 5x + x^2 + 2 - 3x^2$	
$C(x) = -4 + x^3 + 3x^3 + 5x - 2x + x^2$	
$D(x) = x^3 - 2x - 3x^2 - 5x^3 + 8x - 2x^2$	

4) Polynômes et valeurs numériques

$A(x) = -2x^5 - 5x^3 + 3x - 5$	$C(x) = x^3 - x^2$	$S(x) = -x^3 + 4x^2 - 2x - 1$
$B(x) = 4x^3 - x^2 + 2x - 1$	$D(k) = k^3 + 9k^2 + 8k + 2$	$T(y) = y^5 + 2y^3 - 3y + 4$

a) Calcule la valeur numérique des polynômes :

♥ $A(1) =$

♥ $B(-3) =$

♥ $C\left(-\frac{2}{3}\right) =$

♥ $D(10) =$

♥ $S\left(\frac{1}{2}\right) =$

♥ $T(-2) =$

b) Détermine les polynômes suivants et prévois leur degré. Réduis et ordonne le polynôme obtenu.

♥ $W(x) = A(x) + B(x)$	♥ $M(k) = D(k) \cdot (-2)$
♥ $R(x) = A(x) - S(x)$	♥ $P(x) = B(x) \cdot S(x)$

B. Polynômes et Equations

5) Soit un polynôme du second degré. **Calcule** les réels a , b et c sachant que $P(0) = 1$, $P(1) = 1$ et $P(-1) = -3$

6) **Calcule** les réels a , b et c sachant que $Q(x) \equiv (2a - b)x^2 + (a - 2b + 1)x + (a + b + c) = 0$

C. Polynômes et division

7) **Complète** le tableau suivant :

Dividende	Diviseur	Degré du quotient	Nombre maximum de termes du quotient	Premier terme du quotient	Degré maximum du reste
$x^5 - 7x^3 - x^2 + 2x - 3$	$4x^2 - 7x + 2$				

C1) La division euclidienne des polynômes

8) **Calcule le quotient et le reste de la division de** « $x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 5x + 6$ » par « $x^2 - 2x + 2$ »

Note ta réponse sous la forme générale et **vérifie-la**.

C2. La division selon la méthode d'HORNER

9) **Calcule, sans effectuer la division, le reste** des divisions suivantes :

Vérifie ta réponse en calculant le quotient et le reste des divisions en utilisant la méthode de Horner.

(N'oublie pas de noter ta réponse)

1°) $(4x^2 - 5x + 26) : (x + 2)$	2°) $(5x^2 + 7x - 8) : (x - 1)$	3°) $(9x + x^3 - 18) : (x + 1)$
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

10) Le polynôme $P(x) = x^3 + 2x - 3$ est divisible exactement par : (Coche la ou les bonnes propositions)

$x - 3$ $x + 1$ $x - 1$ $x + 2$

11) **Détermine** si ce polynôme $P(x)$ est divisible exactement par $x - 2$.

$$P(x) = x^5 + x^4 - 6x^3 - x^2 - x + 6$$

12) **Détermine le nombre « m » pour** que le polynôme $P(x)$ soit divisible par $x - 3$. **Calcule** le quotient.

$$P(x) = x^2 + mx + 1$$

D. Polynômes et factorisation

13) **Entoure** la factorisation correcte pour chaque polynôme. NF signifie « non factorisable »

Polynôme	A	B	C	D	E
$x^2 - 4y^2$	$(x - 2y)^2$	$(x + 2y)^2$	$(x + 4y)(x - y)$	$(x + 2y)(x - 2y)$	NF
$4a^2 + b^2$	$(2a + b)^2$	$(4a + b)(a + b)$	$(2a + b)(2a - b)$	$(2a + b)(2a + b)$	NF
$x^2 - 10x + 25$	$(x + 5)^2$	$(x + 5)(x - 5)$	$-(x - 5)^2$	$(x - 5)(x - 5)$	NF
$1 + 4u + 4u^2$	$(2u + 1)^2$	$(1 + 2u)(1 - 2u)$	$(1 - u)(1 - 4u)$	$(1 + 4u)^2$	NF
$9x^2 + 16y^2 - 12xy$	$(4x - 3y)^2$	$(3x - 4y)^2$	$(3x + 4y)(3x - 4y)$	$(3x + 4y)^2$	NF
$x^2 + x + 1$	$(x + 1)^2$	$(x + 1)(x - 1)$	$(x - 1)(x - 1)$	$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$	NF
$2y^2 - 4y + 2$	$2(1 + y)^2$	$(\sqrt{2}y - 1)^2$	$2(y - 1)^2$	$(2y - 1)(y + 1)$	NF
$z^2 + 4z - 5$	$(z - \sqrt{5})^2$	$(z - 1)(z + 5)$	$(z + 1)(z - 5)$	$(z - 1)(z - 5)$	NF

14) **Factorise**, au maximum, les expressions suivantes :

- $3x^2 - 30xy + 75y^2 =$
- $32x^3y - 50xy^3 =$
- $5x^5 - 5x =$
- $16a^3y^4 - 100ay^2 =$
- $10x^2 + 30x^3 + 30x + 10 =$
- $100a^4b^4 - 100c^4 =$
- $6x^3 - 12xy^3 - 10x^2y + 20y^4 =$

15) **Factorise** au maximum, les expressions suivantes (**Pistes**: pense à la méthode de Horner ou la méthode des diviseurs binômes)

- $x^2 - 5x + 6 =$
- $x^2 + 9x - 6 =$
- $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 =$
- $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$
- $2x^2 - 5x + 3 =$

Factorisation

16) **Factorise**, au maximum, les expressions suivantes :

Série 1

1) $5a^2 - 5b^2 =$

2) $16a^2 - 16 =$

3) $3x^2y^2 - 3x^2z^2 =$

4) $3ab^2 - 12ac^2 =$

5) $16x^3yz^3 - 25xy^3z^3 =$

Série 2

1) $(a+b)^2 - c^2 =$

2) $25x^2 - (y+z)^2 =$

3) $4(x-y)^2 - 9(x+y)^2 =$

4) $a^2 - 2ab + b^2 - c^2 =$

5) $1 - x^2 + 2xy - y^2 =$

Série 3

1) $x^5 - xy^4 =$

2) $\frac{1}{4}x^2 - y^2 =$

3) $\frac{4}{9}x^2 - b^2 =$

4) $\frac{1}{16}a^4 - b^4 =$

Série 4

1) $\left(\frac{x}{3} + y\right)^2 - \frac{z^2}{16} =$

2) $\frac{a^2}{4} - \left(\frac{a}{2} + \frac{b}{3}\right)^2 =$

3) $36a^2 - (a+b)^2 =$

Factorisation

Série 5

1) $16x^4 - 81 =$

2) $(x+5)^2 - 4 =$

3) $x^2 + 25 + 10x =$

4) $9x^2 + 1 - 6x =$

5) $32x^5 - 50x =$

Série 6

1) $(3x+7)(x+5) + (x+5) =$

2) $(x+3)^2 + (2x+5)(x+3) =$

3) $(5x-2)(3x-1) + (10x-4)(x+1) =$

4) $(x-2)(2x+5) + (2-x)(3-5x) =$

Série 7

1) $x^2 + x - 2 =$

2) $2x^2 + 16x + 32 =$

3) $2x^3 - 3x^2 - 14x + 15 =$

4) $x^3 - 2x^2 + 3x - 6 =$

Série 8

1) $ab+a+bc+c =$

2) $ab+a-bc-c =$

3) $5b-3a-ab+15 =$

4) $ax^2+bx^2+ay^2+by^2 =$

Equation produit

17) Entoure la ou les réponses correctes.

Proposition	Réponses proposées		
$x^2 = 25$ a pour solution	$S = \{5\}$	$S = \{5; -5\}$	$S = \left\{ \frac{25}{2} \right\}$
$x^2 + 25 = 0$ a pour solution	$S = \{5; -5\}$	$S = \{-5\}$	$S = \emptyset$
$(3x - 1)(x + 2) = 0$ a pour solution	$S = \left\{ \frac{1}{3}; -2 \right\}$	$S = \left\{ -\frac{1}{3}; 2 \right\}$	$S = \left\{ -\frac{1}{3}; -2 \right\}$
$(x - 9)^2 = 0$ a pour solution	$S = \{3; -3\}$	$S = \{9; -9\}$	$S = \{9\}$
$x^2 = 5x$ a pour solution	$S = \{5; -5\}$	$S = \{5; 0\}$	$S = \{5\}$
$(x - 2)(x + 6) = (x + 6)$ a pour solution	$S = \{2\}$	$S = \{2; -6\}$	$S = \{3; -6\}$
L'équation « produit nul » est :	$-2x(x - 5) = 0$	$(2x + 3)(x - 5) = 5$	$3 - 2x(x - 5) = 0$

18) Résous les équations suivantes et note l'ensemble des solutions.

$(2x + 3)(x - 7) = 0$	$x^3 + 12x^2 + 36x = 0$
$5x^2 = 45$	$(x + 7)(x + 8) = (x + 7)(3x - 2)$
$36x^2 - 18x = 0$	$x^2(3x - 1) - 4(3x - 1) = 0$

II. Les fractions rationnelles

Ne jamais simplifier dans une somme algébrique

1) **Enonce** la condition d'existence des fractions suivantes :

a) $\frac{3x+2}{x}$	b) $\frac{x+2}{x-3}$	c) $\frac{x-3}{x^2-1}$	d) $\frac{x+2}{(x-3)(x+4)}$
---------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

2) **Simplifie** les fractions suivantes

1°) $\frac{21a^2b^4}{-14a^4b^5}$	2°) $\frac{8x^3-4x^2y}{12xy-6y^2}$	3°) $\frac{x^2+9-6x}{x^2-5x+6}$	4°) $\frac{(x-1)^2-(2x+3)^2}{1-(x+3)^2}$
----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

3) **Relie** chaque expression algébrique de la ligne du dessus avec son expression simplifiée :

les dénominateurs sont supposés non nuls :

$\frac{x}{2x^2+2x}$	$\frac{12x+15}{10+8x}$	$\frac{x^3+3x^2-2x-2}{x-1}$	$\frac{4x^2-9}{4x^2+9-12x}$
○	○	○	○
○	○	○	○
$\frac{3}{2}$	$\frac{2x+3}{2x-3}$	x^2+4x+2	$\frac{9}{8}$
			$\frac{1}{2(x+1)}$
			$\frac{2x-3}{2x+3}$
			$\frac{9}{4}$

4) **Additionne** les fractions suivantes et simplifie (éventuellement) le résultat obtenu :

① $\frac{a}{4a-4} + \frac{4}{4a+4} - \frac{1}{2a+2}$ ② $\frac{x-3}{x^2+6x+9} + \frac{x^2}{x+3}$

5) **Multiplie** les fractions suivantes et simplifie le résultat obtenu :

① $\frac{a+2}{b-4} \cdot \frac{b^2-4b}{4-a^2}$ ② $\frac{2x+2}{x^2-1} \cdot \frac{x+x^2}{4x^2-4} \cdot \frac{2x-2}{x-1}$ ③ $\frac{(-x+y)+(y-x)^2}{(y-x)^2}$

6) **Divise** les fractions suivantes et simplifie (éventuellement) le résultat obtenu :


① $\frac{-5a^6b^2}{3c^5} : \frac{25ab^5c^2}{9c^2}$ ② $\frac{x^2-4}{x-3} : \frac{x-2}{x^2-9}$ ③ $\frac{-4x^3}{2a^2-50} : \frac{6x}{2a-10}$

7) **Mélangeons**

1°) $\frac{4}{a-1} - \frac{5}{a-2}$	6°) $\frac{x+3}{x^2+6x+9} \cdot \frac{x^2-9}{x-3}$	11°) $\frac{a}{a+b} + \frac{a}{a-b} - \frac{2ab}{a^2-b^2}$
2°) $\frac{a-b}{2a} + \frac{4}{b-a} - 4$	7°) $\frac{2}{x+1} + \frac{5}{x-1} + \frac{10}{1-x^2}$	12°) $\frac{2a-2}{a-3} : \frac{a-1}{a^2-9}$
3°) $\frac{x-5}{x} - \frac{4x}{x-5}$	8°) $\frac{x+1}{x+7} - \frac{x-2}{x-5}$	13°) $\frac{4-a}{a} - \frac{2-b}{2b}$
4°) $\frac{x}{x^2-1} - \frac{x}{x-1}$	9°) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} + \frac{2x-3}{x^2-2x}$	14°) $\frac{5xy}{x-y} \cdot \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right)$
5°) $\frac{a^2-2ab+b^2}{xy} : \frac{a-b}{x^2}$	10°) $\frac{4}{1-a^2} + \frac{2}{a-1}$	15°) $\frac{2x-5y+3}{-x+4} : \frac{5y+3-2x}{x-4}$

III. Les fonctions usuelles

1) Une fonction f est représentée dans le plan cartésien



Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

- a) Le zéro et l'ordonnée à l'origine de la fonction f sont positifs
- b) Le zéro et l'ordonnée à l'origine de la fonction f sont négatifs
- c) Le zéro est négatif et l'ordonnée à l'origine est positive
- d) Le zéro est positif et l'ordonnée à l'origine est négative

2) Associe à chacune des courbes suivantes la fonction qui lui est associée.

- a) Donne le nom de la fonction en barrant les mentions inutiles dans chacun des cas précédents.
- b) Ecris la réponse dans l'encadré situé sous le graphe.

$$f_1(x) = 2x^2 - 1$$


$$f_2(x) = -x^2 + 2$$

$$f_3(x) = x^3$$

$$f_4(x) = -2x + 4$$


$$f_5(x) = 0,25x^2$$

$$f_6(x) = -3x$$



- Fonction linéaire,
- Fonction constante,
- Fonction inverse,
- Fonction cube
- Fonction affine,
- Fonction « racine carrée »,
- Fonction carrée (parabole),


Réponse :



- Fonction linéaire,
- Fonction constante,
- Fonction inverse,
- Fonction cube
- Fonction affine,
- Fonction « racine carrée »,
- Fonction carrée (parabole),


Réponse :

Fonctions usuelles



Fonction linéaire, Fonction affine,
 Fonction cube, Fonction inverse,
 Fonction constante, Fonction « racine carrée »,
 Fonction carrée (parabole).


Réponse :



.....

Fonction linéaire, Fonction affine, Fonction cube
 Fonction constante, Fonction « racine carrée »,
 Fonction inverse, Fonction carrée (parabole).


Réponse :



.....

Fonction linéaire, Fonction affine,
 Fonction cube, Fonction inverse,
 Fonction constante, Fonction « racine carrée »,
 Fonction carrée (parabole).

Réponse :




.....

Fonction linéaire, Fonction affine, Fonction cube
 Fonction constante, Fonction « racine carrée »,
 Fonction inverse, Fonction carrée (parabole),

Réponse :

Fonctions usuelles

3) C'est la représentation graphique de la fonction $f : x \rightarrow f(x)$ avec




- $f(x) = x + 2$
- $f(x) = 2x + 1$
- $f(x) = 5x - 2$
- pas de réponse**

Racine(s) de la fonction :

Ordonnée à l'origine :

4) C'est la représentation graphique de la fonction $g : x \rightarrow g(x)$ avec




- $g(x) = -x^2$
- $g(x) = \frac{x^4}{4}$
- $g(x) = -\frac{x^2}{2}$

pas de réponse

Racine(s) de la fonction :

Ordonnée à l'origine :

5) C'est la représentation graphique de la fonction $h : x \rightarrow h(x)$ avec




- $h(x) = \frac{2}{x} - 1$
- $h(x) = -2$
- $h(x) = -\frac{1}{x}$
- pas de réponse**

Racine(s) de la fonction :

Ordonnée à l'origine :

Fonctions usuelles

6) C'est la représentation graphique de la fonction $k: x \rightarrow k(x)$ avec



$k(x) = -2\sqrt{x}$

$k(x) = -\frac{\sqrt{x}}{2}$


$k(x) = -\sqrt{x}$

pas de réponse

Racine(s) de la fonction :

Ordonnée à l'origine :

7) C'est la représentation graphique de la fonction $M: x \rightarrow M(x)$ avec



$M(x) = x^3 - 6$

$M(x) = \frac{x^3}{3}$

$M(x) = \frac{x^3}{4}$

pas de réponse


Racine(s) de la fonction :

Ordonnée à l'origine :

IV. Les fonctions linéaires et les fonctions affines

Fonctions


1. Éléments d'une fonction : en fonction des informations fournies par le tableau suivant, **complète** les cases restées vides :

Fonctions $f: x \rightarrow y$	$f_1: x \rightarrow y = 2x - 3$	$f_2: x \rightarrow y =$	$f_3: x \rightarrow y =$	$f_4: x \rightarrow y =$
Type de fonction :	Affine - linéaire - constante	Affine - linéaire - constante	Affine - linéaire - constante	Affine - linéaire - constante
Croissance/décroissance de f				
Pente de la fonction ou Coefficient angulaire			$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -4$	$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 3$
Ordonnée à l'origine de f			$P = -2$	
Racine de f ou zéro de f				
Représentation dans le plan cartésien				
Caractérisation du graphique (commentaires)				Droite passant par l'origine des axes
Point appartient-il à la droite ? A(4 ; - 2) ? B(0 ; 3) ?				

2. Equations de droites (Reconnaissance/Association/Tracé)


Série 1) Voici les graphiques cartésiens de 5 fonctions.

Associe chaque fonction à son graphique. Note ta démarche.



Fonctions	Nom de la droite	Démarche
$f_1(x) = \frac{1}{2}x$		
$f_2(x) = \frac{1}{2}x + 2$		
$f_3(x) = 3x - 4$		
$f_4(x) = -2x + 2$		
$f_5(x) = -\frac{x}{3}$		

Série 2) Trace le graphique de la fonction g si on sait que sa pente est 3 et que le point $A (5 ; 2)$ appartient à la fonction.



Série 3 : Calcule la pente des fonctions suivantes, selon les informations fournies sur les fonctions :

a) $f_1 : x \rightarrow -2x - 5$ $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \dots\dots\dots$

b) f_2 si $A (6 ; -4)$ et $B (-4 ; 2)$ sont des points du graphique de f_2

c) $f_3 (1) = -4$ et $f_3 (2) = -8$


d) $f_4 (2) = 1$ et $f_4 (-5) = 1$

Série 4. Voici cinq fonctions ; Sachant que le graphique de chacune d'elles est une droite, classe-les en 3 catégories : fonction constante - fonction croissante - fonction décroissante.

Fonctions	fonction constante ? - fonction croissante ? - fonction décroissante ?
$f_1 : x \rightarrow x + 2$	fonction constante - fonction croissante - fonction décroissante
$f_2 : x \rightarrow -2x$	fonction constante - fonction croissante - fonction décroissante
f_3 tel que $f_3 (1) = 3$ et $f_3 (5) = 2$	fonction constante - fonction croissante - fonction décroissante
Si $A (1; -4)$ et $B (2; -3)$ sont des points du graphique de f_4	fonction constante - fonction croissante - fonction décroissante
f_5 si $C (4 ; -3)$ et $D (-5 ; -3)$ sont des points du graphique de f_5	fonction constante - fonction croissante - fonction décroissante


Série 5. Trace le graphique des droites dans le plan cartésien si on te fournit les informations suivantes :

- a) Le point $A (4 ; -1)$ appartient à la droite d_1 et son coefficient de direction (= pente) est -2 .
- b) Le point $B (-3 ; 4)$ appartient à la droite d_2 et son coefficient de direction est 3 .
- c) L'ordonnée à l'origine de la droite d_3 est $y = 2$ et son coefficient de direction est -2 .



Série 6 : Voici les graphiques cartésiens de 3 fonctions.

- a) **Détermine** le coefficient angulaire (= pente) de fonctions associées f_1, f_2 et f_3
- b) **Ecris** les équations des trois droites d_1, d_2 et d_3 .



Droite 1	Droite 2	Droite 3

Série 7) Voici des équations de droites données sous leur forme générale.

$$d_1 \equiv y = -3x - 2$$

$$d_4 \equiv x = 3$$

$$d_7 \equiv y = x - 4$$

$$d_2 \equiv y = 5x$$

$$d_5 \equiv y = -3x - 9$$

$$d_8 \equiv y = -5$$

$$d_3 \equiv y = -2x - 3$$

$$d_6 \equiv y = 0,5x - 1$$

$$d_9 \equiv y = \frac{1}{2}x + 3$$

Identifie la ou les équations de ... (Note ta démarche)

Celle qui a une pente nulle :	Celle qui a une inclinaison de 45° :
Celles qui sont croissantes :	Celle qui a pour racine -3
Celles qui sont décroissantes	Celle qui comprend le point (3 ; 1)
Celles qui sont parallèles :	Celle qui a pour ordonnée à l'origine -2 :
Celles qui sont perpendiculaires :	Celle qui passe par l'origine du repère :

Série 8) Détermine l'équation de la droite ...

O a passant par (1 ; 2) et par (-2 ; -1).

O b perpendiculaire à $y = \frac{1}{2}x - 7$ et passant par (-4 ; 5).

O c passant par (-3 ; -13) et par (21 ; -13).

O d passant par l'origine du repère et par (-2 ; 5).

O e parallèle à $y = -5x + 3$ et dont l'ordonnée à l'origine est 4.

O f passant par (2 ; -9) et parallèle à l'axe des abscisses.

O g passant par (-6 ; -8) et parallèle à l'axe des ordonnées.

V. Les équations de droites (exercices sup)

Série 9) Voici l'équation de la droite d donnée sous sa forme générale.

$$d \equiv -4y + 8x - 12 = 0$$

- Ecris** cette équation sous sa forme canonique.
- Trace** le graphique cartésien de la droite.
- Détermine** le coefficient de direction de cette droite.
- Calcule** l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine de la droite dans le plan cartésien.
- Détermine** les points d'intersection de la droite avec les axes x et y .
- Détermine** le point d'intersection avec la droite $(3x - 6y + 9 = 0)$.

Série 10) Ecris les équations des droites suivantes :

- la droite d_1 passant par les points $(4 ; -2)$ et $(2, 2)$
- la droite d_2 ayant pour coefficient directeur $m = -4$ et passant par le point $(3 ; 1)$
- la droite d_3 perpendiculaire à la droite d d'équation $y = \frac{1}{2}x + 2$ et passant par l'origine du plan.
- la droite d_4 est parallèle à l'axe x et passe par le point $(-4 ; 0)$.
- la droite d_5 est perpendiculaire à la droite d'équation $y = -2x - 1$ et passant par le point $(4 ; 8)$.
- la droite d_6 parallèle à la droite d d'équation $y = 3x + 2$ et passant par le point $(2 ; 4)$.
- la droite d_7 parallèle à la droite d d'équation $y = -x + 1$ et passant par le point $(0 ; 0)$.
- la droite d_8 parallèle à la droite d d'équation $y = -2x + 4$ et dont l'ordonnée à l'origine est $y = -4$
- la droite d_9 parallèle à la droite d d'équation $y = -4x - 4$ et dont l'abscisse à l'origine est $x = 6$.
- la droite d_{10} passant par les points $(4 ; 8)$ et $(-2 ; 8)$
- la droite d_{11} passant par les points $(4 ; -5)$ et $(4 ; 6)$
- la droite d_{12} confondue avec l'axe des abscisses.
- la droite d_{13} confondue avec l'axe des ordonnées.


Série 11) Détermine l'équation des droites qui répondent aux conditions suivantes :

- La droite i passe par le point $(-1 ; 2)$ et est parallèle à la droite d'équation $y = -2x + 3$.
- La droite j passe par les points $(3 ; -1)$ et $(3 ; 5)$
- La pente de la droite a vaut $-3/2$ et a passe par le point $(0 ; -3)$

Droites

Série 12) Associe les expressions algébriques suivantes à la représentation graphique correspondante.

e	$f(x) = -3x + 2$	c	$f(x) = 3x - 1$	l	$f(x) = -x - 1$	i	$f(x) = 2x + 2$
b	$f(x) = -4x$	h	$f(x) = 5x - 2$	j	$f(x) = -2x + 4$	d	$f(x) = 0,5x + 1$
a	$f(x) = 4x - 1$	g	$f(x) = x - 1$	k	$f(x) = -0,5x + 3$	f	$f(x) = -5x + 1$



Série 13) Voici quatre tableaux de correspondance.

Relie le numéro du tableau au type de fonction qu'il représente à la formule qui y correspond.

Tableau 1				
x	1	2	3	4
y	2,5	5	7,5	10

Tableau 2				
x	0	10	20	30
y	30	55	80	105

Tableau 3				
x	0	1	2	3
y	2,5	2,5	2,5	2,5

Tableau 4				
x	1,1	2,2	3,3	22
y	33	66	99	660

Fonction non linéaire	Tableau 1	$y = 2,5$
Fonction linéaire	Tableau 2	$y = 30x$
Fonction constante	Tableau 3	$y = 2,5x$
	Tableau 4	$y = 2,5x + 30$

3. Complète le tableau suivant.

Fonction	Affine ou linéaire	Croissante ou décroissante	Racine	Ordonnée à l'origine
a) $y = \frac{-1}{2}x + 2$				
b) $y = x - 3$				
c) $y = 4x$				
d) $y = -9 - 2x$				
e) $y = -6x$				
f) $y = -x - 5$				
g) $y = x - 7$				
h) $y = x$				
i) $y = \frac{2}{3}x - \frac{2}{5}$				

4. On donne les points $A(0,0)$; $B(-2, 1)$; $C(0, -3)$; $D(-3, 0)$ et $E(-3, -4)$

Si le point appartient à la fonction donnée, fais une croix dans la colonne adéquate.

	$A(0,0)$	$B(-2, 1)$	$C(0, -3)$	$D(-3, 0)$	$E(-3, -4)$
$f_1 : x \rightarrow y = x + 3$					
$f_2 : x \rightarrow y = 2x$					
$f_3 : x \rightarrow y = 5x + 11$					
$f_4 : x \rightarrow y = 2x - 3$					
$f_5 : x \rightarrow y = 3x + 9$					

5. Écris les fonctions suivantes sous la forme $y = mx + p$

	$y = f(x)$	$y = f(x)$
a) $x + y = 2$		f) $3(x - 1) - y = 2$
b) $\frac{x}{3} = y - 3$		g) $2(x + 5) - (y - 3) = 0$
c) $1 - 2y = x$		h) $2(x + y) = 6$
d) $3x + y - 1 = 0$		i) $-6(x - 1) + 3(y + 2) = 12$
e) $x + y = 0$		j) $\frac{x - 1}{2} = \frac{2 - y}{3}$

6. Le coefficient d'une fonction linéaire est -2 .

a) Écris la formule qui lie y à x

b) Détermine l'image des nombres -3 et $7, 5$ par cette fonction.

.....

c) Détermine le nombre dont l'image est 6 par cette fonction.

.....

d) Les points A et B dont les coordonnées sont respectivement $(2, 4)$ et $(-6, 12)$ appartiennent-ils au graphique de cette fonction ? Justifie ta réponse par un calcul.

.....

VI. Systèmes de 2 équations à 2 inconnues

Série 1) Pour chaque proposition, coche la bonne solution.

1) Le système $\begin{cases} x - y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$ admet comme solution, le couple :

 (4; -1)

 (5; 3)

 (-1; 4)

2) Un système de deux équations à deux inconnues :

 peut ne pas avoir de solution

 a toujours une et une seule solution

 ne peut pas avoir une infinité de solutions

3) Le système $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ 2x - 5y = -8 \end{cases}$ admet comme solution, le couple :

 (0; 8)

 (1; 2)

 (3; -4)

4) x et y sont deux nombres dont la somme est 16 et la différence est 2. Quel est le système qui vérifie cette proposition ?

 $\begin{cases} x = y + 16 \\ x = y - 2 \end{cases}$
 $\begin{cases} x + y = 16 \\ x - y = 2 \end{cases}$
 $\begin{cases} x + y = 16 + 2 \\ x - y = 16 - 2 \end{cases}$

5) Dans un système de deux équations où les inconnues sont x et y , si le couple solution est (2; -5), cela signifie que -5 est la valeur de :

 x
 y
 x ou y

6) Le système $\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2x + y = -5 \end{cases}$ admet comme solution, le couple :

 (-1; 2)

 (-2; 2)

 (-2; -1)

7) Le système $\begin{cases} y = 3x - 2 \\ y = 3x + 5 \end{cases}$ admet :

 une infinité de solutions

 pas de solution

 (0; 0) comme solution

8) Le système $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$ admet :

 une infinité de solutions

 pas de solution

 (0; 0) comme solution

9) Une mère a le triple de l'âge de sa fille et, dans 12 ans, l'âge de sa fille sera égal à la moitié de l'âge de sa maman. Quels sont les âges de la mère et de sa fille ?

 42 et 14 ans

 36 et 12 ans

 39 et 13 ans

10) De quel système, le couple $(-1; 5)$ est-il solution ?

$$\begin{cases} 2x + 4y = 22 \\ -3x + 5y = 28 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -x + 2y = 11 \\ 3x - 5y = 22 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 2y = -11 \\ 3x + 5y = 22 \end{cases}$$

11) Par quels nombres entiers (les plus petits possible) doit-on multiplier les équations du système $\begin{cases} 2x - 3y = 20 \\ 5x + 2y = -30 \end{cases}$ pour que les coefficients de x de chaque équation soient opposés ?

 2 et 5

 2 et 3

 5 et -2

12) Isaline achète deux croissants et six éclairs au chocolat pour 3 €. Marion achète neuf éclairs au chocolat et quatre croissants pour 4,3 €. On note x le prix des croissants et y le prix des éclairs au chocolat.

Sélectionne le système qui correspond à ce problème.

$$\begin{cases} 2x + 6y = 3 \\ 9x + 4y = 4,3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 6y = 3 \\ 4x + 9y = 4,3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 6y = 4,3 \\ 4x + 9y = 3 \end{cases}$$

13) Le système $\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1 \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{5} = \frac{2}{5} \end{cases}$ est équivalent au système :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 5x - 2y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ 2x - 5y = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ 5x - 2y = 4 \end{cases}$$

14) Plusieurs copains se cotisent pour l'anniversaire de l'un d'entre eux. Si chacun met 9 €, il manquera 4 € pour le cadeau ; si par contre chacun donne 10€, ils auront alors 5 € de trop.

Quel est le prix du cadeau et combien sont-ils à se cotiser ?

 103 € pour 11 copains

 94 € pour 10 copains

 85 € pour 9 copains

Série 2) **Résous algébriquement** les systèmes suivants. N'oublie pas d'indiquer S l'ensemble des solutions.

$$\begin{cases} -4x + 4y = 16 \\ x - 3y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x - 2y = 8 \\ 6x - 5y = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+3y=-7 \\ 2x=-3-5y \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x-5y+14=0 \\ 4x-3y=7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{2x+3y}{6}=52 \\ x-y=16 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{5x}{6}-\frac{y}{4}=-1 \\ -10x+3y=12 \end{cases}$$


$$\begin{cases} 4(x-1)-3(y-2)=1 \\ -3(x-y)=2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y-\frac{2y+3x}{4}=\frac{y+15}{5} \\ x+\frac{3y-5}{5}=\frac{4x}{3}+5 \end{cases}$$

NAM ex 32

Série 3) A partir du graphique, **estime** les coordonnées du point d'intersection des deux droites.

Recherche les coordonnées exactes de E par une méthode de calcul.



Série 4) Problème

Les parents de la petite Caroline viennent de recevoir la facture de la crèche. Le prix total pour journée et un goûter est de 15 euros. Durant le mois de juin, Caroline a passé 8 journées à la crèche et à manger 4 goûter pour un montant total de 100 euros.

Détermine le prix de la journée et d'un goûter.

Série 5) Problème

Noé organise un spectacle de théâtre « Les Mille et une nuit » avec sa troupe de l'ARU2.

Le prix des places pour les enfants est de 7 euros et celui des adultes est de 10 euros.

La recette s'élève à 420 euros et il y a eu 54 personnes qui sont venues les voir en représentation privée.

Quel est le nombre d'enfants et d'adultes ?

Série 6) Problème

Deux types de voiliers participent à une régata à Brest :

☛ Les « 470 » qui ont à bord deux personnes.

☛ Les "Europe" qui sont manœuvrés par une seule personne.

Au départ de la régata, il y a 52 voiliers et 82 personnes.

Quel est le nombre de voiliers de chaque catégorie ?

Exercices supplémentaires

1. Résoudre algébriquement et géométriquement l'équation suivante, et noter clairement les solutions trouvées

$$3x - 6y + 9 = 0$$

2. Résoudre géométriquement les systèmes suivants :

$$\begin{cases} 12x+4y=8 \\ x+2y=-6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x+4y=-8 \\ y=-1 \end{cases}$$

3. Résoudre algébriquement les systèmes suivants par la méthode de substitution :

$$\begin{cases} 3y - 4x = 9 \\ 2x - 5 = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3y=x+9 \\ 2y-5=3 \end{cases}$$

4. Résoudre algébriquement les systèmes suivants par la méthode d'addition :

$$\begin{cases} 2x-2y=20 \\ 5x+4y=16 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x-8y=5 \\ 2x+7y=-6 \end{cases}$$

5. Sans résoudre les systèmes suivants, prévoir le nombre de solutions de ceux-ci ; expliquez votre raisonnement !

$$\begin{cases} y-2x=-3 \\ y-2x=3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x+y=4 \\ 3x-y=4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2y-x=-3 \\ 4y-2x=-6 \end{cases}$$


6. Problèmes dont la résolution fait appel aux systèmes de 2 équations à 2 inconnues

- Sandrine élève des lapins et des pigeons. Quand on lui demande combien elle en a, elle répond : « ça fait 60 pattes en tout ». Combien a-t-elle de lapins et de pigeons ?
- Le produit de 2 nombres diminué de 12 égale le produit de ces 2 nombres augmentés chacun de 3.
Quels sont les 2 nombres sachant que leur différence est 27 ?
- Les économies de Jennifer sont constituées de billets de 20€. Elle les échange contre des billets de 50 €. De ce fait, elle a 21 billets en moins. Calcule les économies de Jennifer.

VII. Inéquations

Série 1) La racine de la fonction est $-\frac{7}{3}$.

Détermine, sous formes d'intervalle l'ensemble des x qui admettent une image strictement négative.



Réponse :

Série 2) Associe le tableau de signes au graphique qui lui correspond.

$f_1(x) = -x + 3$

	$x < 3$	$x = 3$	$x > 3$
$f(x)$			

$f_2(x) = \frac{x}{3} - 1$

	$x < 3$	$x = 3$	$x > 3$
$f(x)$			

Série 3) Détermine algébriquement la racine des fonctions et complète le tableau de signe.

Fonctions	Racine de $f(x)$	Tableau de signes			
$f_1(x) = -4x + 1$			$x < \dots$	$x = \dots$	$x > \dots$
		$f(x)$			
$f_2(x) = \frac{3x}{2} + 3$			$x < \dots$	$x = \dots$	$x > \dots$
		$f(x)$			

Série 4) Résous les inéquations suivantes.

Représente les solutions sur la droite graduée et sous la forme d'intervalles

$4x - 12 > 6x + 18$	$-4x + 9 \leq 8x - 3$
$12x - 20 > 34x - 42$	$-8x + 9 \geq -7$
$\frac{6x - 21}{14} + \frac{3x - 3}{7} > \frac{9x - 24}{2}$	$3(x - 7) - 4(x + 7) > x + 2$

VIII. Equations du premier degré**Résoudre algébriquement les équations suivantes : (N'oublie pas la solution)**

$5(x-3) - 4(x+2) = 2(x+3) + 5(5-x)$	$3(5x-4) - 20 = 5(3x-7)$
$3(x^2-2) - (2x+2)^2 = (4-x)(4+x)$	$3(x+2) = 3x+6$
$\frac{3x-4}{6} - \frac{4x-7}{9} = 1-3x$	$x(2x-1) = x(x+2)$

$$\frac{5}{x} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{3}{x} + \frac{2}{x+1} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{x}{3} = \frac{12}{x}$$

$$\frac{-3}{4} = \frac{2}{x}$$

$$\frac{4}{x} - \frac{x}{x-1} = \frac{x^2}{x^2-x}$$

$$\frac{-1}{x} = \frac{-x}{4}$$

$$\frac{2}{x-4} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{2x-1}{x-1} + \frac{2}{x+1} = \frac{2x^2}{x^2-1}$$

$$\frac{2}{x+1} = \frac{x+4}{2}$$

$$\frac{3}{x-1} = \frac{2}{2-3x}$$

$$\frac{2x+1}{1-x} = \frac{1-2x}{3+x}$$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} = \frac{-x^2}{x^2-x}$$

$$\frac{3}{x+2} = \frac{2}{x+1}$$

$$\frac{x}{x+4} + \frac{x}{4-x} = \frac{1}{x^2-16}$$



$$\frac{2}{x^2-2x+1} - \frac{2}{1-x} = \frac{x^2}{x+1}$$

x

I. Cas d'isométrie des triangles

1 Connaissance des cas d'isométrie

En observant les renseignements fournis par chaque dessin, complète le cas 'isométrie et l'implication





Δ et Δ

..... =
 =
 =

} $\Rightarrow \Delta$ Δ

2 Utilisation des cas d'isométrie

Les égalités fournies permettent-elles de conclure que les triangles sont isométriques? Si oui, énonce le cas d'isométrie utilisé. Si non, explique pourquoi.



$|\hat{U}| = |\hat{E}|$
 $|AU| = |RE|$
 $|VA| = |OR|$



Démonstrations : voir cahier (Site)

II. Les figures semblables

1 Soient trois triangles semblables représentés schématiquement




Fig 1




Fig 2




Fig 3

- Calcule les longueurs des côtés du triangle n°3
- Calcule le rapport de similitude pour passer de la figure 1 à la figure 2
- Le périmètre de la figure 2 est

2 Soient les triangles ABC et DEF tels que $|AC| = 6$, $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle ACB = 40^\circ$, $\angle EDF = 50^\circ$, $\angle DEF = 90^\circ$, $|EF| = 15$ et $|DF| = 20$

- Les 2 triangles sont-ils semblables ? **Justifie** ta réponse.
- En cas de réponse positive, **calcule** la mesure de [AB]

3 On t'informe que les triangles ABC et A'B'C' sont semblables.

Si $|BC| = 5$, $|AC| = 7$, $|AB| = 3$ et $|B'C'| = 10$, **calcule** $|A'C'|$ et $|A'B'|$.

4 En observant les 2 dessins ci-dessous, complète les lignes du tableau dans lequel k désigne le rapport de la similitude qui applique le « grand triangle sur le petit »







Figure	K	AN	AQ	NQ	NP	QS	AP	AS	PS
1		5		2	3			8	
2		2		5		4,6	3		

III. Le théorème de Thalès et sa réciproque.




Dans quel cas proposé, peux-tu affirmer que PS , MT et NR sont parallèles ? (Justifie)




	MN	TR	NP	RS
a)	2	3	4	6
b)	3	2,5	4	3

2. Sachant que l'on a $d // d'$, calcule $|CE|$ et $|DE|$ dans les 2 cas ci-dessous



3. Les droites DE et BC sont parallèles. Calcule x et y sachant que $|AD| = 3$ et $|AE| = 5$



4. Construis un triangle ADE sachant que $|AD| = 4,1$,
 $|AE| = 6,4$ et $|DE| = 7$.

Place le point B sur [AD] tel que $|DB| = 1,6$ et

le point C sur [AE] tel que $|AC| = 4$.

Les droites (BC) et (DE) sont-elles parallèles ? Justifie.

5. Calcule au dixième près la moyenne proportionnelle entre 7 et 9. Construis !

6. Calcule la quatrième proportionnelle entre 2, 5 et c. Construis le segment.

7. Coordonnées du milieu d'un segment [AB]

Coordonnée de A	Coordonnée de B	Coordonnée de M, milieu de [AB]	AB
(2 ; 3)	(7 ; 4)		
(0 ; 5)	(-2 ; 5)		
(..... ; 5)	(3 ;)	(5 ; 3)	

8. Trace un segment [AB], sans mesurer, construis le point M du segment [AB] tel que $|AM| = \frac{4}{7} |AB|$

9. Des bateaux participent à une régates.

Ils doivent suivre le parcours suivant (en gras et fléché sur la figure) :

On donne : $|DM| = 8$ km

$|DF| = 6$ km

$|MA| = 2 \times |DM|$

$\angle FDM = 90^\circ$


$F \in DG$ et $M \in DA$

les droites FM et AG sont parallèles.

1. Calcule $|FM|$.

2. Calcule $|FG|$.


3. Calcule $|AG|$.



4. Vérifie que la longueur de la régates est de 60 km.

IV. Trigonométrie


1) ABC est un triangle rectangle en A tel que $AC = 2\text{cm}$ et $BC = 6\text{cm}$.



.....

Calculer la mesure de l'angle \hat{C} .


2) ABC est un triangle rectangle en A tel que $\hat{C} = 50^\circ$ et $BC = 6\text{cm}$.



.....

Calculer la longueur de AB.


3) DEF est un triangle rectangle en E tel que $FE = 3\text{ cm}$ et $DF = 4\text{cm}$.



.....

Calculer la mesure de l'angle \hat{D} .

4) RST est un triangle rectangle en S tel que $\hat{T} = 57^\circ$ et $RS = 19\text{cm}$.



.....

Calculer la longueur de ST.

5) Arthur veut connaître la hauteur d'un arbre.


Il dispose d'un appareil de mesure dont l'objectif est situé au point A, à 1,70 m au-dessus du sol.

Ce point A est à 60 mètres de l'arbre.

Le sol est horizontal.


Il mesure l'angle \hat{BAC} . Il trouve 23° .

Calcule la hauteur de cet arbre.



6) Du balcon de mon appartement situé au deuxième étage d'un immeuble, j'aperçois dans le chantier situé en face, une grue. L'immeuble se trouve exactement à **19,8 mètres** du pied de la grue. Placé à **8 mètres** au-dessus du sol, j'ai déterminé (à l'aide d'un simple rapporteur) l'angle sous lequel je voyais la grue. Cet angle \widehat{BOA} est égal à **61°**.

- En appelant H le point de $[BA]$ tel que OH et AB soient perpendiculaires, et en constatant que $|HA| = 8$ m, calcule la mesure de l'angle \widehat{HOA} arrondie au degré près.
- Calcule $|HB|$ au cm près.
- Calcule la hauteur de la grue au cm près.



N.B. : la grue est supposée verticale et le sol horizontal.

V. Le théorème de Pythagore

Série 1. Simplifie les radicaux suivants :


$$\sqrt{75} \qquad \sqrt{108} \qquad \sqrt{25.80}$$

$$\sqrt{\frac{50}{16}} \qquad \sqrt{\frac{45}{20}}$$

Série 2. Calcule la longueur de la diagonale d'un carré de 5 cm de côté.

Série 3. Calcule la longueur de la hauteur d'un triangle équilatéral de 6 cm de côté.

Série 4. Sur le triangle rectangle suivant, a , b , c , d , e et h désignent des longueurs. Complète le tableau avec les valeurs exactes




	a	b	c	d	e	h
1°)		12		5		
2°)		9			15	
3°)				3	7	

I. Angles et cercle

1 Justification d'amplitudes par l'énoncé du théorème correspondant


A, B, C, D, E et F sont six points situés sur le cercle de centre O. Place les indications sur le schéma

a) Sachant que $\widehat{EDB} = 89^\circ$, recherche l'amplitude de l'angle \widehat{BCE}




l'amplitude de l'angle \widehat{BCE} est $\dots\dots\dots$
 car $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

b) Sachant que $\widehat{DOF} = 110^\circ$, recherche l'amplitude de l'angle \widehat{FCD}



l'amplitude de l'angle \widehat{FCD} est $\dots\dots\dots$
 car $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

c) Recherche l'amplitude de l'angle \widehat{AED}



l'amplitude de l'angle \widehat{AED} est $\dots\dots\dots$
 car $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

2 Tracé

<p>d) construis l'angle au centre qui intercepte le même arc que l'angle inscrit représenté</p>	<p>e) construis l'angle inscrit qui intercepte le même arc que l'angle au centre représenté</p>
---	---

3 Démonstrations angles à côtés perpendiculaires, à côtés parallèles,

II. Angles tangentiels

1. Sur un cercle C de rayon 3, trace un angle tangential en un point A du cercle, dont l'amplitude égale 50° .